
ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA: Alerta de El Niño Costero



Elaboración: COES PRODUCE

EL NIÑO COSTERO CONTINUARÍA HASTA INICIOS DE INVIERNO DE 2027

El calentamiento del mar se mantiene en gran parte del Pacífico tropical, alcanzando su máxima intensidad en la superficie frente a la costa peruana (Figura 1). El Niño costero (región Niño 1+2), iniciado en marzo de 2026, se mantendría con una magnitud extraordinaria2 hasta febrero de 2027 (Figura 2) debilitándose progresivamente hasta julio de 2027. Asimismo, El Niño en el Pacífico central (región Niño 3.4) continuaría con una magnitud muy fuerte3 hasta febrero de 2027, iniciando posteriormente un declive que llevaría a una condición neutra en junio de 2027 (Figura 2).

Las precipitaciones, de noviembre 2026 a enero 20276 continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra norte occidental, costa central y sierra central occidental, incrementándose la ocurrencia de los episodios de moderada a fuerte intensidad, en particular en la costa norte. Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serían de normales a inferiores; en la región del Titicaca, se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

Para el verano de 20277, las precipitaciones se mantendrían por encima de lo normal a lo largo de toda la costa, la sierra norte occidental y central occidental, siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; mientras que, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

Los caudales continuarían superiores a lo normal8 en los ríos de la costa norte, tales como Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, en particular los ríos Tumbes y Piura donde serían muy superiores. Esta tendencia se extendería hacia la costa centro y sur desde enero de 2027 para los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Pisco e Ica. En contraste, en la sierra sur centro oriental los caudales se mantendrían de normal a inferior. Por otro lado, los ríos tributarios del Lago Titicaca continuarían con caudales por debajo de lo normal, afectando la recuperación del nivel del lago Titicaca. Para la Amazonía, en la selva norte los caudales continuarían normales, pero en el centro y sur serían menores a lo normal, en los ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

Comunicado Oficial ENFEN N°019-2026; 30 OCTUBRE 2026 21:00 pm[citado 02 NOVIEMBRE 2026]. Disponible en:
https://www.gob.pe/institucion/senamhi/colecciones/1308-comunicados-enfen

RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda a las instituciones del sector producción activar sus planes y protocolos.
- ✓ Recomendar a toda la Comunidad Pesquera que realiza actividades portuarias y de pesca, que tomen medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales.
- ✓ Contar con una mochila de emergencia equipada.
- ✓ Estar atentos ante nuevos Boletines Océano Atmosféricos ENFEN a través de la página Web del COES PRODUCE http : http://coes.produce.gob.pe/

COES PRODUCE
MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS
San Isidro, 13 de Noviembre de 2026 a las 14:58 horas